

令和8年度 水稻ドローン防除履歴（JA大井川作業委託分）

時期	適用病害虫名	防除薬剤	有効成分	希釈倍率	散布基準	使用方法
①出穂始め	いもち病 ごま葉枯 他	ブラシンフロアブル	フェリムゾン15% フサライド15%	8倍	2種混合 0.8ℓ/10a	無人航空機による散布
	カメムシ類 ウンカ類	スタークル液剤10	ジノテフラン10%	8倍		無人航空機による散布
②穂揃期	カメムシ類 ウンカ類	スタークル液剤10	ジノテフラン10%	8倍	0.8ℓ/10a	無人航空機による散布
③乳熟期	カメムシ類 ウンカ類	エクシードフロアブル	スルホキサフル20%	16倍	0.8ℓ/10a	無人航空機による散布

【参考 使用薬剤の登録内容】

ホクコー
ブラシン®フロアブル

■種 類 名：フェリムゾン・フサライド水和剤

■有効成分：フェリムゾン_____15.0%
 フサライド_____15.0%

■化管法指定物質：フェリムゾン〔第1種〕_____15.0%
 フサライド〔第1種〕_____15.0%

■登録番号：第19166号

■毒 性：普通毒(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

■登録初年：1996.03.12

■性 状：類白色水和性粘稠懸濁液体

■有効年限：5年

■包 装：500ml×20本、5ℓ×4缶（3年）

【特長】

- 治療効果にすぐれるフェリムゾンと、予防効果に定評のあるフサライドの混合剤で、散布適期幅が広い。
- ごま葉枯病や変色米など穂枯れ性病害にも有効な総合殺菌剤である。
- 稲こうじ病のほか内穎褐変病やもみ枯細菌病にも有効。
- 地上散布から無人航空機散布、空中散布まで幅広い方法で使用可能。

【適用内容】（2024 年 11 月末日現在）

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェリムゾン を含む 農薬の 総使用回数	フサライド を含む 農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） 褐条病 変色米 （カーブラリア菌） （エビコッカム菌） （アルタナリア菌）	1000 倍	60～150 ℓ /10a	収穫 7 日 前まで	2 回以内	散布	2 回以内	3 回以内
		300 倍	25 ℓ/10a					
		30 倍	3 ℓ/10a			空中散布		
	稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 墨黒穂病	8 倍	800 ml/10a			無人航空 機による 散布		

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈 倍数 (倍)	使用液量 ($\frac{\text{g}}{\text{L}}$ /10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	スルホキサ フルールを含 む農薬の 総使用回数
稲	—	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類	2000	60～150	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	500	25			無人航空機に よる散布	
			16	0.8				