



みかん

最後まで摘果

《樹上選果》

樹上選果では、病害虫被害果やキズ果の粗皮果等の外観不良果と規格外の大きさの果実を摘果します。天成り果等の果梗が太い果実は、秋芽が発生しないよう果梗枝ごとハサミで間引きます。樹上選果でこれらの商品価値の低い果実をどれだけ摘果できるかが、収穫・家庭選果の省力化や、消費者に喜ばれるミカンづくりへつながります。

《秋肥》

秋肥は、果実生産により弱った樹の樹勢の回復、耐寒性の向上、翌春の着花量や発芽量を確保することを目的に施用します。

時期	品種	肥料名	施肥量	備考
10月下旬	早生	粒状固形26号	4袋/10a	
11月上旬	青島	粒状固形248号	3袋/10a	一般土壌
		相配6号	4袋/10a	耕土の浅い園地

《病害虫防除》

10月に入っても高温多雨の日が続く場合は黒点病の防除が必要です。ただし、収穫前30日の使用になるので、農薬の適正使用基準に注意しましょう。秋期のミカンハダニについても、果実品質を著しく低下させますので、徹底防除に努めましょう。また、カメムシについては、秋の発生量は平年より少ないと予想されていますが、今後とも園地をよく観察し発生に注意しましょう。

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用基準
10月上旬	黒点病	ベンコゼブ水和剤	600倍	30日-4回
10月中旬	ミカンハダニ	カネマイトフロアブル	1,500倍	7日-1回
発生時	カメムシ・ミドリヒメヨコバイ	ロディー乳剤	2,000倍	7日-4回
降雨が多い場合	褐色腐敗病	ストロビーDF	2,000倍	14日-3回



果樹林産センター
小杉 真啓