



田植え後の 管理

米



焼津営農経済センター
深沢 侑

《水管理》

田植え直後はやや深水として、風いたみ等を防ぎます。水が澄んだら、ジャンボタニシ対策でスクミノンを施用します。

翌日からは活着を良くし、茎数の増加を助けるため基本的に浅水で管理します。

除草剤の施用時は、深水にしているから処理します。7日間は止め水管理とします。ただし、瀧がでてしまつようならば水を入れます。田植え後2週間から20日で、半日〜1日水を落としてガス抜きをします。ガスの発生が多い水田はガス抜きを繰り返します。

《除草剤》

①体系処理

代かき時にサキドリEWを使用した場合は田植え10日後頃アクシズMX粒剤を10アールあたり1kg散布します。

②粒剤散布

田植え後10アールあたり1kg散布します。機械散布、散粒機または手まきに対応しています。処理時の水深は3cmから5cmを目安として下さい。

③ジャンボ剤



田植え3日後以降に、銀河ジャンボは田植え5日後以降に散布します。畦畔から投げ込むだけの省力的な除草剤です。処理時の水深は5cmから7cmを目安として下さい。

※【表1】参照

④本田後期剤

ノビエ5葉期まで効果のあるクリンチャーバスメ液剤またはワイドアタックSCを中干し期に散布します。散布後の晴天が続く日を選んで散布すると取りこぼしのヒエ、多年雑草に効果があります。

【表1】

商品名	おすすめの 使用時期	コメント
 ミスターホームランジャンボ500g	田植え3日後〜ヒエ2葉期まで	低コストな投込式の省力型初中期一発除草剤
 パワーウルフ1キロ粒剤	田植え時〜ヒエ2.5葉期	特にホタルイに高い効果！ 安価で非常に高いコストパフォーマンス
 カチボシ粒剤511キロ粒剤	田植え時〜ヒエ2.5葉期	土壌吸着効果でヒエ長期残効で非常に高い効果！ 白化剤とSU剤によってホタルイ・コナギ・イボクサ・クサネムにも高い効果！
 銀河ジャンボ400g	田植え5日後〜ヒエ3葉期まで	ヒエ長期残効効果で新規SU剤で抵抗性ホタルイ等にも高い効果！！クログワイ塊茎形成抑制する省力型初中期一発除草剤
 アクシズMX粒剤1キロ粒剤	田植え10〜15日後使用	サキドリEWとの体系防除で使用！ 土壌吸着効果で、ヒエに対して持続的に高い効果！ クログワイの塊茎形成抑制する水稻雑草全般に優れた中後期除草剤

※農薬のラベルを必ず確認し適正に使用して下さい。