

おすすめ 資材

金谷営農経済センターが
おすすめします!



根菜類の害虫に有効な
「フォース粒剤」

3kg **2,634円** (税込)

◎特徴

ラディッシュ・ダイコン・カブ等における根菜類の根肌を汚くする原因の多くが、キスジノミハムシの食害です。播種時に土壌混和することで、被害を防ぐことができます。




キスジノミハムシの幼虫の食害

◎使用方法

ラディッシュは、10aあたり6~9kg。播種時に全面土壌混和で、使用回数1回となります。

こちらは劇物のため、購入の際は印鑑が必要となります。使用量は作物により異なりますので、詳しい使用方法については、最寄りの営農経済センターにてご相談ください!

栽培カレンダー



④ 追肥・中耕


2回目、3回目の間引きをしたあと条間に追肥し、中耕します。




(1㎡当たり) 茶果菜10号 90g
茶まきときは、畝間にまいて竹べらで土と混ぜる

⑤ 収穫

根が肥大したのから順次収穫します。



Point! 球形状でも管理が悪いと、不整形や裂根が生じます。



高温期に栽培したとき

収穫遅れや土壌水分の急変

① 畑の準備

種まき2週間前までに苦土石灰を1㎡あたり200gをまいて畑をよく耕しておきます。種まき1週間前までに堆肥と茶果菜10号を施して、土によく混ぜ込みます。




(1㎡当たり)

堆肥 2kg

茶果菜10号 90g

② 種まき

畝幅80cm、畝間50cmで畝を作り、板切れ等で15cm間隔に溝をつけ、溝に1.5cm~2cm間隔で種をまきます。



床面をていねいにならす


板切れで溝をつける。幅2cm、深さ1cmくらい

種間隔2cmくらいにまきつけ約1cm厚さに覆土する

長型のプランターなら2列まきに

③ 間引き

密植は根形を崩す原因になります。特に根が肥大しはじめてからの込みすぎは、根の生長に支障をきたすので、間引きは遅れずに行いましょう。



発芽そろい

第1回 本葉1枚のとき

3~4cm

第2回 本葉3枚のとき

6~7cm

第3回(最終株間)

根が1.5~2cmに肥大したころ

ラディッシュ

・植物分類 アブラナ科 ・原産国 ヨーロッパ

ラディッシュは短期で収穫できるので、ハツカダイコンともよばれます。形や色も豊富にあり、サラダの彩りに最適です。コナガ、ヨトウムシなどの害虫の食害を受けやすいので、発生の多い時期にはネットや不織布などべたがけ資材を被覆して飛来を防ぎましょう。

収穫適期を逃すと、「す」入りになってしまいます。一度にたくさん収穫するよりも、1~2週間ごとに少しずつ種まきをすることで、少しずつ何回も収穫できるようにしましょう。



金谷営農経済センター 花澤 良太