

アグリ ワーク ポイント AGRI WORK POINT



二番茶期を迎えます

茶指導販売課 菊川



今月からいよいよ二番茶期に入ります。この時期は例年雨が多く、天候が不安定な時期になりますので気象状況を確認し管理作業の適期を逃さないようにしましょう。

二番茶の摘採

二番茶の摘採期は、一番茶摘採後約**45〜50日前後**が目安となります。二番茶芽は生育が早いため茶園を観察して摘採期の判断をすることが大切です。長期予報では曇りや雨が続きと予想されているため、早いうちから摘採計画を立てて適期摘採を行きましょう。

夏肥（2回目）の施用

先月に続き**夏肥（2回目）**の施用を行います。夏肥は主に三番茶の収量・品質向上のほか翌年一番茶の母枝母葉の充実にも効果がありますので、計画的に作業を行きましょう。

時期…6月下旬頃（二番茶摘採後、なるべく早いタイミング）

使用資材…有機質肥料など

施肥量…年間施肥量に対し20%を目安に

病害虫の防除

① **チャノミドリヒメヨコバイ・チャノキイロアザミウマ**

気温の上昇に伴い、この時期から動きが活発になります。夏場の発生を抑えるには、**二番茶萌芽期〜開葉期頃**に防除を行うことが大切です。

② 炭疽病

気温が高く降水量が多いと発生しやすくなり、**10時間以上**雨に濡れると発生リスクが高まるとされています。茶園を観察し発生状況に合わせて防除を行いましょ。

管内EC気象データ 6月の積算降水量と平均気温（初倉・船木）

管内（初倉・船木）の過去の気象データは以下の通りです。

近年、年間を通して気温の上昇が激しいため高温に注意が必要です。

降水量については年によってややばらつきがあるため気象状況をよく確認しましょう。

平均気温	積算降水量	2021年	2022年	2023年	2024年
21・5℃	164mm	2021年	2022年	2023年	2024年
22・1℃	194mm				
22・2℃	498mm				
22・2℃	386mm				